

**NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE**

Nome e Cognome _____ data di nascita _____

Trattamento proposto:	INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA (IVG CHIRURGICA), ai sensi Legge 194/1978
Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa?	<p>Gravidanza indesiderata tra 9 settimane e 12 settimane + 6 giorni.</p> <p>È un intervento chirurgico che ha la finalità di asportare la gravidanza intrauterina.</p> <p>L'intervento è di breve durata (10-15min), effettuato in sedazione profonda. Si effettua mediante la dilatazione del collo dell'utero con dei coni metallici (coni di Hegar) che permettono una dilatazione progressiva della cervice uterina e la successiva introduzione all'interno della cavità uterina di una cannula rigida atraumatica (cannula di Karman). La cannula è connessa ad un dispositivo che crea una pressione negativa in maniera tale da permettere l'aspirazione del materiale ovulare.</p> <p>Al termine della procedura di isterosuzione può essere necessario eseguire una revisione della cavità uterina con curette metallica smussa al fine di completare l'asportazione del materiale abortivo ("raschiamento").</p> <p>Prima della procedura chirurgica è necessaria una preparazione farmacologica della cervice uterina mediante applicazione endovaginale di prostaglandine (misoprostolo 200mcg, 2 compresse), al fine di facilitare la dilatazione del collo dell'utero.</p>
Quali sono i possibili problemi di recupero?	<p>L'intervento viene effettuato in regime di Day Hospital e prevede la dimissione al domicilio il giorno stesso.</p> <p>Nei giorni successivi la paziente si deve aspettare una perdita ematica genitale e dolore pelvico similmenstruali, trattabile al domicilio con analgesici comuni.</p>
Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento?	Prosecuzione della gravidanza
Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi?	<ul style="list-style-type: none">- Emorragia significativa in corso di intervento 0.3%- Rischio di trasfusione 0.1%- Infezione post operatoria 0.5%- Necessità di ripetere l'intervento (incompleto) 1-4%- Perforazione uterina 1 %- Pelvipertonite post-intervento <1%- Sinechie uterine (per procedure ripetute) 0.4 %
Quali sono le alternative al trattamento proposto se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze/effetti indesiderati conosciuti?	<p>IVG farmacologica (se entro 9 settimane)</p> <p>Vedi nota informativa dedicata</p>
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento?	Il personale Medico non obiettore della SC di Ostetricia e Ginecologia

Qualora lo ritenga necessario, l'equipe è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

DATA _____

FIRMA DEL MEDICO