



"Ospedale Sant'Anna di Como"
Presidio di San Fermo della Battaglia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

Presidio Ospedaliero Sant'Anna

San Fermo della Battaglia (CO)

Direttore f.f. : dr. Michelarcangelo Partenope

Tel 031.585.9093

.....Se_fYHfJUh031"585.9094

.....segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it

.....michele.partenope@asst-lariana.it

CURVA GLICEMICA – Albanee

NGARKESA E GLUKOZES NE GJAK (OGTT)

Ngarkesa e glukozës në gjak është një test që përdoret për:

- Dianjoza e diabetit mellitus: provimi përbëhet nga matja e niveleve të glukozës në gjak esëll dhe dy or pas marrjes së një zgjidhjeje glukozë me gojë
- Ekzaminimi i diabetit në shtazani: në këtë rast tërheqjet e gjakut janë 3 (esëll, pas 1 orë dhe pas 2 orësh pas marrjes së glukozës).

SI TË KRYET TËRHIQJA E GJAKUT:

Kryet një tërheqje e parë në të cilën kryhet matja e glukozës në gjak esëll.

Pacienti është i ftuar për të pirë një zgjidhje glukozë që përbëhet nga uji dhe 75 g sheqer.

Pas marrjes së zgjidhjes, gjaku tërhiqet pas 2 orësh.

Në rastin e shfaqjes së diabetit në shtazani, një tërheqje e tretë kryhet pas një ore tjetër.

SH.M. Pas marrjes së zgjidhjes së glukozës, pacienti, për 2 orët e ardhshme, nuk mund të hajë, të pijë apo të ecë, mund të cohet vetëm për të tërhequr gjakun.

Në rast të sëmundjes (të përzier, të vjella, marramendje) Pacienti duhet të këshillojë personelin shëndetësor.

Në asnjë rrethanë pacienti duhet të hiqet nga salla e dhomës.

Ultimo aggiornamento: settembre 2020