



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

**Centro delle Terapie Anticoagulanti**

**Centro accreditato FCSA n°171**

**Sede di Como** – via Napoleona, 60 tel. 031 585 5396 fax 031 5855671

**Sede di Cantù** – via Domea, 4 tel. 031 799 340 fax 031 799429

**Sede di Menaggio** – via Casartelli, 11 tel. 0344 33225 fax 0344 33220

## **DIPARTIMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI**

**U.O. Patologia Clinica– U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale**

**Direttori: dr. Michelarcangelo Partenope – dr.ssa Maria Cristina Buonanno**

**Referente FCSA dr.ssa Giuseppina Serricchio**

### **SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (DOA)**

Tutti i farmaci anticoagulanti hanno lo scopo di prevenire la formazione di coaguli, rendendo più fluido il sangue; il principale effetto indesiderato di tale terapia è l'incremento del rischio di sanguinamento.

I DOA entrano in azione molto rapidamente e rapidamente cessano la loro attività; sono eliminati in misura variabile per via renale. Al momento sono disponibili test per misurare in urgenza\ emergenza la concentrazione di tali farmaci.

Per un miglior esito del trattamento anticoagulante e per una maggiore sicurezza per il paziente è opportuno attenersi alle regole elencate di seguito:

- Seguire scrupolosamente le prescrizioni nell'assunzione della dose giornaliera, l'aumento o la diminuzione della dose prescritta può compromettere il risultato.
- Presentarsi puntuale ai controlli che verranno effettuati dopo 1-3-6-12 mesi (salvo diversa indicazione e/o necessità) con controlli ematochimici prescritti dal medico del Centro.
- Il farmaco va sempre assunto alla stessa ora del giorno.

La compressa di Rivaroxaban (Xarelto) e le compresse di Dabigatran (Pradaxa) vanno assunte a stomaco pieno.

- Se si dimentica di assumere una dose di:

Dabigatran (Pradaxa) o Apixaban (Eliquis): si può assumere il farmaco fino a 6 ore prima della successiva dose; se questo non fosse possibile, la dose va tralasciata e non bisogna raddoppiare la dose alla successiva assunzione.

Rivaroxaban (Xarelto) ed Edoxaban (Lixiana): si deve assumere il farmaco immediatamente e proseguire il giorno successivo con l'assunzione monogiornaliera raccomandata. Non deve essere assunta una dose doppia in uno stesso giorno per

compensare la dimenticanza della dose (fanno eccezione le prime 3 settimane di terapia delle trombosi venose con Rivaroxaban: in caso di dimenticanza di una dose posso essere assunti complessivamente 30 mg di Rivaroxaban).

- Avvertire il medico del centro, qualora si dovesse intraprendere una nuova terapia oppure interrompere o variare il dosaggio di una terapia già in atto.
- Non utilizzare farmaci che contengono Acido Acetilsalicilico perchè possono aumentare il rischio emorragico. In caso di rialzo febbrile e/o di dolori di qualsiasi origine, si raccomanda di assumere farmaci quali Paracetamolo (Tachipirina), paracetamolo + codeina (Coefferalgan o Tachidol), ibuprofene (Brufen) e metimazolo (Novalgina).
- In caso di inizio di nuove terapie, chiedere sempre a chi prescrive il farmaco se sono possibili interferenze con la terapia anticoagulante e contattare il Centro per eventuali modifiche della dose.
- Evitare le iniezioni intramuscolari. Qualora fosse necessario, applicare del ghiaccio sia prima che dopo l'iniezione sulla zona; non massaggiare. Non è controindicata la vaccinazione anti-influenzale.
- Avvisare il medico del Centro TAO qualora si dovesse sottoporre ad intervento chirurgico, estrazione dentaria, cure odontoiatriche o manovre che comportino un certo rischio emorragico, al fine di poter intraprendere opportune misure terapeutiche, 5 giorni prima. In nessun caso diminuire o sospendere la terapia di propria iniziativa, a meno di sanguinamenti gravi.
- Avvertire tempestivamente il medico del Centro o recarsi al più vicino Pronto Soccorso qualora dovesse notare il manifestarsi di segni di emorragia (urine color marsala, feci nere, sangue nelle urine o nelle feci o altre manifestazioni emorragiche).
- Informare il medico del Centro di ogni ricovero, consegnando la fotocopia della lettera di dimissione al successivo controllo e comunicare sempre ogni cambiamento di numero telefonico o di Fax.
- Per le donne in età fertile: il farmaco è potenzialmente rischioso per il feto. Un'eventuale gravidanza in corso di terapia anticoagulante andrà pertanto discussa e programmata al fine di evitare pericolose esposizioni del feto ad un farmaco potenzialmente dannoso.

I medici del Centro di **Como** sono reperibili in Ambulatorio dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 circa al seguente numero telefonico: 031-585 5396

Per problemi di tipo amministrativo il numero della segreteria del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale a cui chiedere informazioni è il seguente: 031- 585 5396, il numero di fax è 031-5855671.

Email: [tao.como@asst-lariana.it](mailto:tao.como@asst-lariana.it)

I medici del Centro di **Cantù** sono reperibili in Ambulatorio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 circa al seguente numero telefonico : 031-799 340.

Per problemi di tipo amministrativo il numero della segreteria del laboratorio a cui chiedere informazioni è il seguente: 031- 799 421, il numero di fax è 031-799 429.

Email: [tao.cantu@asst-lariana.it](mailto:tao.cantu@asst-lariana.it)