



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

SCHEDA INFORMATIVA VACCINO TRIVALENTE ANTIDIFTERICO TETANICO PERTOSSE

www.asst-lariana.it > VACCINAZIONI

La **difterite** è una grave malattia infettiva causata da una tossina prodotta da un batterio. La malattia produce la formazione di membrane nel naso e nella gola che talvolta possono impedire la respirazione.

In alcuni casi la malattia può provocare gravi danni agli organi interni come cuore, reni e sistema nervoso, paralisi e morte per soffocamento.

La difterite si trasmette per contatto con un malato o portatore o per contatto indiretto con oggetti contaminati (giocattoli, stoviglie, ecc.).

Il tetano è una malattia infettiva non contagiosa dovuta alla tossina prodotta da un batterio molto diffuso nell'ambiente che penetra attraverso ferite, anche piccole, della cute o delle mucose contaminate da terriccio o da oggetti sporchi. Le tossine danneggiano il sistema nervoso causando contrazioni muscolari dolorose e persistenti, l'evoluzione è sempre molto grave e spesso può portare a morte.

La pertosse è una malattia infettiva causata da un batterio. E' caratterizzata da tosse violenta. Nel primo anno di vita è più grave: a questa età, infatti, durante gli accessi di tosse possono presentarsi crisi di apnea (il bambino non respira) molto prolungate e pericolose; può inoltre essere ostacolata la normale alimentazione del bambino. La malattia si associa spesso a complicanze respiratorie (broncopneumoniti, ecc.) e del sistema nervoso centrale (convulsioni, encefaliti, ecc.).

E' molto contagiosa e si trasmette dalle persone infette con le goccioline di saliva.

VACCINO TRIVALENTE DTPa

E' un vaccino combinato che garantisce un'elevata efficacia protettiva, la somministrazione avviene per via intramuscolare nella fascia anteo-laterale della coscia o nel muscolo deltoide secondo l'età. E' un vaccino obbligatorio per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni a seguito dell'entrata in vigore della L.119/2017, come ultimo richiamo del ciclo di base effettuato dal bambino.

Successivamente per mantenere l'immunità nel tempo, è consigliato effettuare ogni 10 anni per tutta la vita un richiamo con vaccino trivalente antidifterite-tetano-pertosse. vi è particolare indicazione all'esecuzione di una dose con vaccino antidifterite-tetano-pertosse per le donne nell'ultimo trimestre di gravidanza (dalla 27° settimana di gravidanza, idealmente alla 28° settimana) indipendentemente dall'anamnesi clinica e vaccinale (malattia pregressa o vaccinazione pregressa).

CONTROINDICAZIONI:

- reazione allergica grave (anafilassi) ad una precedente dose di vaccino o ad un suo componente
- malattie neurologiche gravi progressive

E' opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

EFFETTI COLLATERALI:

Entro 24 - 48 ore possono verificarsi effetti collaterali nella sede dell'iniezione: dolore, gonfiore, eritema, indurimento, ingrossamento delle linfoghiandole . Possono verificarsi inoltre febbre anche di grado elevato, vomito, diarrea, esantemi, irritabilità, pianto continuo od anomalo (di solito entro 48 - 72 ore).

Nella maggioranza dei casi questi effetti collaterali sono di lieve entità e durata.

Molto raramente possono verificarsi reazioni più gravi a carico del sistema nervoso, dell'apparato gastro-intestinale, della cute e del tessuto sottocutaneo. Tuttavia la frequenza di effetti collaterali gravi è sempre di gran lunga inferiore alle complicanze delle malattie da cui i vaccini proteggono. Solo in casi eccezionali si possono manifestare eventi avversi molto gravi che costituiscono pericolo di vita per il bambino (reazione allergica grave).