



**Gastroenterologia Generale e Multimodale
ed Endoscopia Digestiva**
Responsabile: dr. Gian Marco Ideo

Segreteria 031.585.9394
gastro@asst-lariana.it

Dipartimento di Chirurgia

Chirurgia Generale - Cantù
Endoscopia Cantù
segreteria 031.799.466
sem.endoscopia@asst-lariana.it

Chirurgia Generale - Menaggio
Endoscopia Menaggio
segreteria 0334.33.333 – 0334.33.341
endoscopia.menaggio@asst-lariana.it

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA: note preparazione all'esame endoscopico.

Ricordatevi di:

- essere a digiuno da almeno 8 ore se l'esame verrà effettuato entro le ore 13:00; è consentita colazione leggera (the e due biscotti) entro le ore 8 se programmato nel pomeriggio.
- continuare ad assumere le terapie in corso (farmaci per il cuore, pressione, respiro) con un piccolo sorso d'acqua.
- essere accompagnati da persona adulta.
- portare con Voi l'impegnativa del Medico Curante, tessera sanitaria ed eventuali esenzioni, eventuale documentazione clinica e radiologica (ecotomografie, TC, RMN), referti di precedenti esami endoscopici e l'eventuale lista dei farmaci assunti.

Sulla base delle linee guida europee attualmente pubblicate, si consiglia il seguente approccio al trattamento anticoagulante od antiaggregante (*); in caso di impossibilità alla sospensione dei farmaci sottoriportati per motivi clinici, l'esame endoscopico sarà solo diagnostico e non operativo:

a) terapia anticoagulante

- sospendere per tempo l'assunzione di farmaci anticoagulanti (Sintrom® , Coumadin®): il paziente deve rivolgersi al Centro di Riferimento o al Medico di Medicina Generale per la sospensione di tale terapia che dovrà avvenire almeno 5 giorni prima dell'esame e per l'eventuale prescrizione della terapia eparinica sostitutiva; in particolare, l'ultima dose di eparina non dovrà essere assunta la mattina dell'esame.

b) terapia con anticoagulanti di nuova generazione "NOACs" (Xarelto, Eliquis, Pradaxa); vanno sospesi 48 ore prima dell'esame.

c) terapia antiaggregante

- acido acetilsalicilico (Aspirina®, Aspirinetta®, Cardioaspirin®, Cardirene®, Ascriptin®): non è necessaria la sospensione.

- ticlopidina (Tiklid®, Clopidorel (Plavix®), Prasugrel (Efient®), Ticagrelor (Brilique®)): la terapia va sospesa 7 giorni prima dell'esame endoscopico; previo parere del Medico di Medicina Generale eventuale prescrizione della terapia eparinica sostitutiva che non dovrà essere assunta la mattina dell'esame.

d) doppia terapia antiaggregante: o associazione antiaggregante ed antiaggregante: vanno sospesi solo previo accordo con il Cardiologo curante

(*) Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline update. Veitch AM et al, Endoscopy 2021; 53